

KLÓRMENTES USZODAVÍZ-FERTŐTLENÍTÉS DINADOX A+B

klórmentes uszodavíz-fertőtlenítőszer



ALKALMAZÁS:

Foglalkozásszerű felhasználásra.

KISZERELÉS:

- 10 kg és 20 kg-os kanna
(visszaváltható göngyöleg)

MÉRÉS:

- klórdioxid mérőcsikkal,
- kolorimetriás teszterrel.
DPD módszer esetén szabad vagy kötött aktív klór jelenlétében a pontos méréshez GLYCINE reagenst kell alkalmazni.
- fotométer PoolLab

SZAVATOSSÁG:

aktiválástól számított
30 napig

OTH ENGEDÉLY SZÁM:

6501-3/2014

dinax®

LONGLIFE
CHLORINE FREE WATER TREATMENT FOR LONG LIFE

Uszodavizek fertőtlenítésére. Alkalmas uszodavíz, uszodai nyomás alatti gyorszűrők, csővezetékek folyamatos és sokkoló (időszakos nagy dózisu) fertőtlenítésére. A klórnak ellenálló baktériumok jelentős részét is pusztítja. Kiváló biofilm-leválasztó hatása van. Szabad vízfelszínen a levegővel való érintkezés miatt a szer koncentrációja rohamosan csökken.

Kérjük fokozottan ügyeljen a koncentráció fenntartására (a szer folyamatos után-adagolására). Szabad aktív klórt tartalmazó fertőtlenítőszerrel együtt alkalmazva a két szer a kezelt vízben egymás hatását erősíti. Tömény állapotban más vegyi anyagokkal ne keverje! A medencevízben a szerhez ajánlott készítményekkel keveredhet.

ADAGOLÁS:

Folyamatos használat esetén:

Mennyiségarányos vegyszeradagoló szivattyúval állítható be a kívánt koncentráció. Csőrendszerekben az egyenletes eloszlás elősegítése érdekében javasoljuk statikus keverők használatát vagy a szer vízforgató szivattyú elé adagolását. Az elkészült oldatot ne hígítsa!

FELTÖLTÉSKOR: 0,2 mg/l koncentráció eléréséhez 1m³ medencevízhez 67 ml DINADOX®-ot kell adagolni. (0,1 mg/liter klór-dioxid koncentráció létrehozásához 100 m³ uszodavízhez 3,35 liter DINADOX® adagolása szükséges.)

FOLYAMATOS HASZNÁLAT: Uszodavíz fertőtlenítésére a DINADOX® legalább 0,2 mg/l és legfeljebb 1,0 mg/l klór-dioxid koncentrációban alkalmazható. Szabad klórral kombinálva is használható, legmagasabb együttes koncentrációjukra vonatkozó előírás: $2 \cdot [Cl] + [ClO_2] = 1$ (mg/l). A napi adag a medence fürdőzőterhelésének függvénye.

Sokkolás:

Időszakos, nagy dózisu kezelés a fürdővendégek távollétében. Szokásos adagja:

- **homokszűrőbe** töltve töltet m³-enként: 10 liter DINADOX® vagy
- **medencébe** töltve 300-670 ml medencevíz m³-enként.

Fürdőző a medencében nem tartózkodhat addig, amíg a szabad aktív klór kétszerese és a klórdioxid összegének szintje az 1 mg/l értéket meghaladja.

A biocid hatás kifejtéséhez folyamatos adagolásnál 0.2 mg/l klórdioxid koncentráció és feltöltéskor 2 óra hatóidő szükséges.

TÁROLÁS: száraz, hűvös, fénytől védett helyen, eredeti kannában.
FIGYELEM! A BEKEVERT ANYAGOT 35 °C ALATT KELL TÁROLNI!

Fertőtlenítőszer alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!

KLÓRMENTES USZODAVÍZ-FERTŐTLENÍTÉS

DINADOX A+B

klórmentes uszodavíz-fertőtlenítőszer



ALKALMAZÁS:

Foglalkozásszerű felhasználásra.

KISZERELÉS:

- 10 kg és 20 kg-os kanna (visszaváltható göngyöleg)

MÉRÉS:

- klórdioxid mérőcsikkal,
- kolorimetriás teszterrel. DPD módszer esetén szabad vagy kötött aktív klór jelenlétében a pontos méréshez GLYCINE reagenst kell alkalmazni.
- fotométer PoolLab

SZAVATOSSÁG:

aktiválástól számított 30 napig

OTH ENGEDÉLY SZÁM:

6501-3/2014

dinax[®]

LOGLIFE
CHLORINE FREE WATER TREATMENT FOR LONG LIFE

ADAGOLÁSI ÚTMUTATÓ

Általános adagolási mennyiség: 0,02 kg / m³ / nap

ÁTLAGOS adagolási mennyiségek medencetípusok szerint:

MEDENCETÍPUS	ADAGOLANDÓ MENNYISÉG (ml)	TÉRFOGAT (m ³)	IDŐ
VERSENYMEDENCE	7 ml	1 m ³	1 nap
TANMEDENCE	20 ml	1 m ³	1 nap
STRANDMEDENCE TÉLEN	7 ml	1 m ³	1 nap
STRANDMEDENCE NYÁRON:	7 ml	1 m ³	1 nap

Példák az adagolásra:

- Versenymedence (2500 m³): 7 ml × 2500 m³ = 17.5 liter/nap
 Tanmedence (100 m³): 20 ml × 100 m³ = 2.0 liter/nap
 Strandmedence télen (1800 m³): 7 ml × 1800 m³ = 12.6 liter/nap
 Strandmedence nyáron (2600 m³): 7 ml × 2600 m³ = 18.2 liter/nap

ALGAMENTESÍTÉSHEZ - adagolás:

FOLYAMATOS adagolás megelőzésre:

100 m³ / 2 kg / nap
 1000 m³ / 7 kg / nap

A napi mennyiség folyamatosan, egyenletesen szétosztva adagolandó adagolószivattyúval (pl. Stenner).

SOKKOLÓ adagolás:

100 m³ / 3-5 kg

Beadagolás: egy dózisban a medencevízbe öntve.
 Este adagolva 12 óra alatt majdnem teljesen lebomlik.

Fertőtlenítőszer alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!